

# Xerostomia e Iposalivazione



## PROPRIETÀ

- Spray ad intensa attività umidificante della cavità orale.
- Stimolante la secrezione salivare residua
- Dolcificato con Xilitolo.

## BENEFICI

- Dona rapido sollievo.
- Favorisce la salivazione.
- Recupero immediato della facoltà di parlare e deglutire con facilità.

DISPOSITIVO MEDICO CE

# SalivAktiv® Spray orale 50 ml

## SCHEDA PRODOTTO

### DENOMINAZIONE:

SalivAktiv spray orale

### 1.INGREDIENTI:

Glicerina vegetale, Acqua; Xilitolo, Calcio lattato, Acido Malico, Betaina, Sodio citrato biidrato tribasico, Polivinilpirrolidone, Urea, Sodio fosfato monobasico, Potassio cloruro, Magnesio cloruro, Aroma menta; Sodio benzoato

### 3.FORMA FARMACEUTICA:

Flacone spray 50 ml

### 4.INFORMAZIONI CLINICHE

#### 4.1 Indicazioni terapeutiche:

SalivAktiv è un Dispositivo Medico CE spray da applicare direttamente nella cavità orale; utile in tutte le forme di xerostomia (secchezza della bocca) e iposecrezione salivare di varia origine ed eziologia, causate in particolar modo da radioterapia, chemioterapia, terapie farmacologiche malattie rare ed autoimmuni (Sjögren) e metaboliche. La xerostomia definisce una condizione caratterizzata da una sensazione soggettiva di secchezza della bocca e diminuita umidificazione e lubrificazione della cavità orale con severità variabile. La xerostomia è la conseguenza di una insufficiente o diminuita produzione di saliva. L'utilizzo di SalivAktiv spray orale con agenti bioadesivi, lubrificanti, idratanti e sia-logoghi è il modo più sicuro ed economico per alleviarne i disagi.

#### 4.2 Posologia e modalità di impiego:

Agitare bene prima dell'uso. Indirizzare lo spray nella zona sublinguale e palatale distribuendo uniformemente. Adulti e Bambini a partire dagli 8 anni - 1-2 nebulizzazioni per applicazione, mediamente 4-6 volte durante l'arco della giornata o secondo necessità.

#### 4.3 Controindicazioni:

In gravidanza ed allattamento assumere il prodotto solo sotto consiglio medico. Non assumere il prodotto in caso di gastropatie.

#### 4.4 Effetti indesiderati:

Alle dosi suggerite non è stato riportato il verificarsi di effetti collaterali. Qualora si presentassero effetti collaterali inattesi, sospendere il trattamento con il prodotto e consultare un medico.

#### 4.5 Interazioni con altri medicinali

È consigliabile consultare il medico in caso di terapie farmacologiche in atto.

#### 4.6 Avvertenze

Tenere fuori dalla portata dei bambini. Non somministrare il prodotto sotto gli 8 anni di età. Si consiglia di non assumere quantitativi maggiori di quelli indicati, in quanto dosi più alte possono causare l'insorgenza di effetti collaterali inattesi. Per periodi di utilizzo superiori ai 30 giorni, è raccomandabile interrompere il trattamento con SalivAktiv® per almeno 3-5 giorni. Non assumere in caso di intolleranza al prodotto. Non assumere in caso di ipersensibilità nota ai componenti.

### 5. PROPRIETÀ FARMACOLOGICHE

#### 5.1 Proprietà farmacodinamiche:

L'azione dei componenti di SalivAktiv® è diretta al recupero delle ottimali condizioni di umidificazione, lubrificazione e protezione della bocca. SalivAktiv® contiene un'associazione di sali minerali, agenti umettanti e lubrificanti ed è in grado di stimolare la secrezione salivare residua nel corso di radioterapia, chemioterapia, terapie farmacologiche, malattie rare, autoimmuni e metaboliche

### 6. INFORMAZIONI FARMACEUTICHE

#### 6.1 Lista degli eccipienti:

Composizione quali-quantitativa completa.

#### 6.2 Validità:

36 mesi

#### 6.4 Speciali precauzioni per la conservazione:

Conservare a temperatura controllata tra 15° - 25° C in luogo asciutto e lontano da fonti di luce diretta e dall'umidità.

#### 6.5 Natura, contenuto del contenitore, prezzo:

Flacone in HDPE di 50 ml con capsula spray

#### 7. NOME E INDIRIZZO DEL DISTRIBUTORE:

**BIOPHARM s.r.l. - Peschiera Borromeo**

**DISPOSITIVO MEDICO CE**

**biopharm**

Numero Verde  
**800 - 418 110**